

Libr. impr. rar.

Quart. 43.

Haller (Bibl. Anat. 1. v. 192.)

"Hujus rarissimi libri quatuor tantum
plera exempla apud reperiri."

Das ist zu viel gesagt,
allein ungenau selbst ist es, z. B.
in Paris fehlt er. Daher der
ungeheure Preis.

Libr. impet. quart.

Dieses Buch habe ich im
November 1824 durch Ludwig
Frank's und Bremser's Gefälligkeit
in Parma (wahrscheinlich von
Fattori's Witwe) für vierundzwanzig
Dukaten (= achtundfiebenzigthalerspreuß.)
erstanden.

In Deutschland ist außer dem gegenwärtigen
noch ein Exemplar in der K. Bibl. in Berlin
und eins in der R. K. Bibliothek in Wien.

Haller besaß ein Exemplar, das er von Gutz
für ihn in Italien für 30 Dukaten gekauft hatte.

In Italien sind noch ein paar Exemplare. Eins in
Rom, eins in Ferrara, eins in Parma, eins in Pavia.

Vergl. Choulant. Gniffi. In Ausbeurtheilung Abbildung.
S. 34.

Insunt:

Foll. 20.

*Picturae 27 (auct. Hieronymo Carpi s. Grassi
vid. Füsslii lexicon d. Künstler
u. Carpi).*

1
MUSCULORVM HVMANI COR-
PORIS PICTVRATA DISSECTIO
PER IOANNEM BAPTISTAM
CANANVM FERRARIEN-
SEM MEDICVM, IN BAR-
THOLOMEI NIGRISO-
LI FERRARIENSIS
PATRITII
GRATIAM, NVNC PRIMVM
IN LVCEM EDITA.

BARTHOLOMEO NIGRISOLO

FERRARIEN. PATRITIO IO

ANNES BAPTISTA CA

NANVS FERRARI

ENSIS MEDI

CVS. S. D.

Galenus Pergamenus Medicorum omnium post Hippocratem facile princeps, inter alia singulari, ac rara eruditione referta commentaria. quæ in amicorum gratiam et medentium. vsum composuit, ævatomixæ quoque exigentis, idest dissectionis administrationes, primum quidem duobus voluminibus comprehensas, Vt Flauio Boethio Romanorum consuli viro anatomicæ speculationis maxime cupido morè gereret, conscripsit, Secundo autem post Boethii obitum, alias (quæ aliqua ex parte extant) longe illis uberiores, amicorum precibus compulsus, exaravit. In quibus modum, ac ordinem dissecandarum Simiæ partium, utpote animalis homini quàm simillimi, plenissime docuit. Cum itaque et tu Bartholomee Nigrisole, Nobilissime pariter, et doctissime, non minus anatomicæ speculationis desiderio nunc ardeas, quàm Flavius ille Boethus vir consularis olim arserit, Et nobis humana corpora dissecantibus sæpe affueris, quantæque necessitatis ac utilitatis in re medica (præsertim quæ manu medetur) sit anatomæ peritia, non solum ex Galeni testimonio, verum et oculis ipsis perspexeris,

A ii

videasq; nostræ tempestatis chirurgos, maiori ex parte, dissectionum imperitos, ac propterea exitio hominibus plerumq; potius, quam saluti esse conspicias, sepissime nos hortari nō destitisti, ut humani corporis partes, nostra opera, picturis expressas in lucem ederemus. Sic enim fieri posse arbitraberis, ut qui rem medicam profitentur, et ex dissectionū oculis lata inspectione corporum partes agnoscere nō possunt, si ex pictura saltem aliquam illarū cognitionem haberent, tutius humanæ saluti consulere valerent. Cui tam crebræ tamq; saluberimæ exhortationi tuæ diūtius repugnare, ac obistere non potuimus, tanta enim est humanitas tua, tantaq; tuorū erga me meritorū magnitudo, ut me quippiā tibi negare piaculum putem. Varię igitur cum sint hominum partes, nullę tamen sunt, quæ magis rerum extrinsecarum appulsu ledantur iis, quæ musculi dicuntur, Musculi enim vulnerantia, pungentia, tudentia vè, primi excipiunt, eam ob rem hos ipsos eleganti pictura, per Hieronymum Carpenssem, pictorem nostro ævo non minus diligentem, quàm insignem, delineatos, in tui gratiam, et hominum salutem, edere decreuimus. Prodeunt itaq; tuis auspitiis, et in lucem exeunt, vir ornatissime, humanorum artuum musculi, quos, quanta valuimus diligētia, Antonio Mario Canano Ferrariensi Medico, mihi arctissima consanguinitate coniuncto monstrantes, dissecuimus, et Typis excudi curauimus, eosq; nunc tui nominis immortalitati dicamus, opus autem hoc nostrum lecaturos oratos velim, ne ipsum prius damnet, quàm cum re ip-

3
sa, sæpè inspiciendo, id contulerint. Sic enim arbitror ipsos, conatus nostros boni potius consulturos, quàm in eos ge-

nuinum inique fracturos. Vale.

CANDIDO LECTORI.

QUum corpora et viua, et mortua secari possint, utrunq; secandi modū ex antiquioribus aliqui (celaso referente) vituperarunt, Primum, veluti crudelem et medico, humane salutis præfidi, non conuenientem, viuorum quippe hominum aluum, atq; precordia incidere, latrocinantis potius medici esse putabant, quàm qualia sint hominis interiora discere cupientis, cum præsertim ex his, quæ tanta violentia querantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere, Nam color, mollities, durities, leuitas, asperitas, talia non sunt inciso corpore, qualia integro fuere, quoniam si corpora inuiolata, metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, milleq; aliis affectibus quibus obnoxia sunt mutantur, multo magis interiora, quibus maior mollities, et lux ipsa noua existit, sub grauissimis vulneribus et ipsa trucidatione mutantur, stultumq; videtur, quale quidque viuo homini est, tale morienti, imo iam mortuo, esse existimare, si quid tamen sit, quod spirante adhuc homine, aspectui subiiciatur, id casus sæpe curantibus offert contingit enim interdum hominem sic vulnerari, ut interior aliqua pars nudetur, et in alio alia, vnde sedem, ordinem, figuram, magnitudinem, similiaq; alia prudens medicus per misericordiam sanitatem moliendo, quæ alii per cædem dira crudelitatem, cognoscit. Ob hoc ne alterum quidem sectionis modū, mortuorum scilicet lacerationem, necessarium esse dicebant,

4

qui et si non crudelis, fœdus tamen existit, cum aliter pleraque in mortuis se habeant, et quæ in viuis cognosci possunt, ipsa curatio abunde demonstret. Cœterum hæc ipsa, corporum anatomen non verè oppugnantia illius utilitatem ac necessitatē agnoscetes facile confutabunt, duplex enim cum sit corporum dissectio, viuorum scilicet, et mortuorum ex prima (si recte administratur) internarum aliquot partium (et si non omnium) actionem ad earum curationes cognitu necessariam, agnoscemus, non quidem viuos homines secando (quod crudelis, et carnificis potius hominis, quàm medici esse videtur) sed bruta magis animantia, quæ quàm plurimis ex partibus, atq; earum functionibus homini quàm simillima sunt, ut in renibus, vteris, vesica, vtero, intestinis, lactibus, omēto, liene, ventriculo, hepate, transuerso septo, gulla, pulmonibus, corde, et similibus aliis, ex altera verò mortuorum dissectione, partium figuram, numerum, situm, colligationem, et actionem quandoq; (ut musculis ad originē tractis) res ad medendi peritiam maximè necessarias discere licet, Nec hoc fœdum est, imo pulchrum, valdeq; conueniens, si laborantium partium curationem, et agnitionē, ad quam casus sufficere nullatenus potest, nobis ipsis præ oculis posuerimus, rara enim vulnera sunt, per quæ interiora ita aperiantur ut eorum figuram, positum, societatemq; adamusim cognoscere valeas, et si casu aliquibus partibus id euenerit, non omnibus tamen unq; euenerit, Verum in mortuorum dissectione omnes hominis partes breui tempore cognos-

cinus, quas per casum homini, quantum vis laborioso, et
prudenti, etiam si nestoreos annos viueret, cognoscere non da-
retur. Cum igitur, et in viuorum animantium, defunctorumque
hominum dissectione, quantum nobis per adolescentiam nos-
tram licuit, diligenter admodum versati fuerimus, multaque
ab antiquis iam pridem litterarum monumentis tradita oculo-
lis ipsis perspexerimus, nonnulla etiam nostra opera adinues-
nerimus, a communi medentium usu non aliena, dignum du-
ximus horum aliqua medicinae sectatoribus impartiri, Hincque
effectum est, ut Primum hunc musculorum dissectionis libe-
rum crebris Bartholomei Nigrifoli Ferrariensis. Patritii effla-
gitationibus impulsus ediderimus, Reliquos sub calchographi
prelo iam positos mox edituri. Hunc itaque benigno animo
accipias velim candide lector, tua enim benignitas perinde
ac calcar quoddam erit, quod me ad maiora assidue impela-
lat, Tu interim vale, deosque nobis, tantis in laboribus pro-
pitios precare, Instituti vero nostri ita nascatur exordium.

5
IONNIS BAPTISTAE CANA-
NI FERRARIENSIS ME-
DICI HUMANORVM
MUSCULORVM
PICTVRATAE
DISSECTI-
ONIS.


LIBER PRIMVS.

IN hoc primo libro Galenum sequentes Manus mus-
culos ponemus, nomine autem manus (Hippocratis et
Galenimore) vulgo dictum brachium intelligimus, quod
in tres primarias partes diuiditur, extremam scilicet manum
(quae absoluto nomine, manus dici solet) cubitum, et βραχι-
ονα a Graecis appellatum, extrema manus tres habet par-
tes, digitos videlicet, brachiale quod Graece κρατος nominatur,
et inter hec medium, Graeci μετὰ τὸν κρατος nuncupant,
nos postbrachiale dicimus. Brachium siue malis Graece δι-
cere βραχιον unico osse constat, quod Celsus humerum ap-
pellauit, Cubitus vero (quem brachium nominat) duobus,
quorum vnus Graece κρατις latine radius dicitur, alter autem
a Graecis quidem τῶνκος a Celso vero cubitus nominatur,
At in extrema manu septem et viginti ossa existunt, octo
scilicet brachialis, quatuor postbrachialis, et quindecim dis-

MVSCVLORVM ANATOMES

gitorum, quę omnia nouisse oportet ad exactam musculorū
in hoc primo libro depictorum cognitionem, hec pauca præ
fati ad propositum accedamus.

MEMBRÆ PRIMVS. V2VM



Hac in pictura hi nu
dantur musculi vides
licet.

A. MVSCV
LVS Flectens bra
chiale ad minimum
digitum.

B. MVSCV
LVS Volæ.

C. MVSCV
LVS Tendonum
scissorum, sub quo est
musculus habens ten
dines non fissos am
bo digitos flectunt.

D. MVSCV
LVS Flectens bra
chiale propè magnū
digitum.

E. MVSCV
LVS Manum pro
nam faciens.

F. MVSCV
LVS. Manum su
pinam redens.

MVSCVLORVM ANATOMES.




MVSCVLVS
 Volæ manus qui se-
 cundum antiquos (ut
 ait Galenus secundo
 de usu partiũ et pri-
 mo de Anatomicis
 aggressionibus, flectit
 et ipse quinq; digitos
 secundum ipsum aus-
 tem factus est, ad fir-
 mandam cutim ma-
 nus internam, melior-
 ris apprehensionis gra-
 tia, ad prohibendũq;
 ortum pilorum, causa
 exquisitoris sensus.
 Ratio vëro Galeni
 primo de Anatomicis
 aggressionibus contra
 antiquos est. Oportet
 inquit secundum an-
 tiquos tendinem mus-
 culi mouentis aliquẽ
 articulum inseri ossi
 illius. Ast tendo mus-

LIBER PRIMVS

culi volæ non inseritur ossibus digitorum, igitur non potest
 secundum eorum placita digitos mouere. Ratio autem hæc
 licet contra antiquos sit valida, simpliciter tamẽ videtur in-
 valida. Posset enim quispiam dicere, non esse necessarium
 semper tendinem musculi mouentis articulum inseri, siue cõ-
 iungi ossi articuli, sed sat fore si iungatur alicui cõiuncto ossi,
 pro ut tendo huius musculi coniungitur ligamento, quod iũ-
 ctum est ossibus digitorum. Oritur hic musculus ab interno
 brachii nodo, mediusq; procedens inter musculõs carpũ flec-
 tẽtes, suo tendine supereminet ligamento interno, quod iun-
 git cubitam radio, postea dilatatur illius tendo in trianguli
 figura, cuius acumen est prope ligamentum dictum, basis
 autem in principio postbrachialis, quæ per quinq; veluti ten-
 dines inseritur ligamento, comprehẽdenti aliorũ digitos flec-
 tentium musculorum tendines, Bifariam hunc tendinem li-
 cet secare cõm cute videlicet, et sine cute.

MVSCVLORVM ANATOMES




MVSCVLVS
Flectēs brachiale, qui
oritur ab interiore no
do brachii, cubito ad
herens, inserit ossi rec
to, mēbraneoq; quod
ē regione minimi dia
giti, ex secūdum cub
iti processū existit,
quē Greci anatomici
modo *ρεσφοειδης*
modo *στυλοειδης* nomi
nabunt.

LIBER PRIMVS




MVSVLVS
Flectēs brachiale pro
pe magnum digitum,
Oritur ab interiore
nodo brachii obliqua
usq; aliquātiſper su
pra cubitum tendens,
radio protensus, inse
ritur per tendinem os
si postbrachialis ante
indicem, licet primo
aspectu videatur in
seri ossi brachialis pro
pe magnum digitum.

MVSCVLORVM ANATOMES



MVSCVLVS
Desinens in tendines
fissos flectens secundum
articulum digito-
rum, præter articu-
lum magni digiti qui
non accipit tendinem
ab hoc musculo, oris-
tur ab interiore nodo
brachii aliquàliter cu-
bitum attingendo, in-
seriturq; tendinibus se-
cundo interno. lio qua-
tuor digitorum, conti-
neturq; sub ligamēto
radio, et cubitū
interna in parte con-
stringente.

LIBER PRIMVS



MVSCVLVS
flectens, secundum Ga-
lenum, primū et ter-
tium articulum quatu-
or digitorū, magni au-
tē digiti tantū. secundum
et tertium inter-
nodiū flectit, Oritur
à partibus cubiti ius-
ta gibberum, et per
profundiora mediam
radii cubitiq; regionē
vniuersam cōplexus
vtriq; ossi coheret, ac
in tres veluti partes
delineatus est, quarū
vna minimum digitū
respicit, altera indicē,
tertia medios digitos,
Cōtinētur huius mus-
culi tendines sub liga-
mento stringente radi-
um, et cubitū intrin-
secus, per mediasq;
scissiones tendinū flecto

MVSCVLORVM ANATOMES

tentum secundum internodium quatuor digitorum ad eorum extremitatem feruntur, et vna cum tendinibus precedentis, sub eodem ligamento à principio digitorum, vsq; ad finem protensi sunt, per quod ligamentum vult Galenus hunc musculum flectere primum internodium digitorum quatuor, verum non maior videtur ratio de illo, quam de hoc ipso, cum ipsius tendines sub eodem ligamento comprehensi sint.

LIBER PRIMVS.



MVSCVLI, pro nam facientes manū, quorum alter oritur ex elatioribus partibus nodi interioris brachii, obliquusq; supra cubitum latus inseritur radio intrinsecus ad medias ipsius vsq; partes extensus. Reliquus vero ex inferiore parte cubiti iuxta brachiale exortus obliquus inseritur ossi radii, habent terminum carnosum et tamen ossa mouent, licet Galenus Primo de motu musculorum scribat, Musculos mouentes ossa in tendines omnino maiores vel minores terminare. De propositis aut in secundo de usu partium opus positum asserit.

MVSCVLORVM ANATOMES



In hac pictura hi apa-
parēt musculi vide-
licet.

A. Musculus ex inte-
rioribus vnus, qnq; tē-
dines nō fissos p ducēs

B. Musculus supinā
manum reddens.

C. Musculus brachi-
ale ad minimum dia-
gitum reflectens.

D. Musculus minia-
mū digitū extendens,
ac in latus ducens.

E. Musculus digitos
tres extendens.

F. Musculus indicē
in latus ducens.

G. Musculus bifidus
magnum digitū ab aliis
abducendo extēdens.

H. Musculus duplici
tendine carpū euertens


I. Musculus supinam
manum faciens.

2^{do} LIBER PRIMVS.




Musculus q secundum
Galenum quatuor ha-
bet tēdines ad quatu-
or digitos præter mas-
gnū tēdētes, re autem
ipsa tantū tres habere
videtur ad tres digi-
tos iter magnū et mi-
nimū porrectos, ex qui-
bus duo duplices apa-
parēt, tēdo scilicet in
dicis, et tēdo ānularis
q duas habet propagi-
nes, quarū vna cōiun-
gitur tēdimi ad media-
um digitū tēdēti, alte-
ra vero ei q ad mini-
mū digitū procedit, et
ā pprio musculo origi-
nē ducit Cōtinet hic
musculus sub ligamē-
to extrinsecus strin-
gēte radium et cubi-
tum, ortūq; habet ab
exteriore nodo brachii
et supra radiū ptēdit

MVSCVLORVM ANATOMES.



MVSCVLVS,
 oriens á nodo exte-
 re brachii cubito, ra-
 dioq; per longitudinē
 hærens, et sub pro-
 prio ligamento in fine
 cubiti astrictus, suo
 tendine ossi postbra-
 chialis ante minimū
 digitum insertus, bra-
 chiale ad minimum
 digitum extendit.

LIBER PRIMVS.




MVSCVLVS
 ex nodo exteriore bra-
 chii oriens, radium et
 cubitum per longitu-
 dinem attingens, in fi-
 ne cubiti proprio liga-
 mento cōtensus in du-
 os tendines scinditur
 ad minimum digitum
 tendentes, ipsumq; in
 latus, vel in inferiorē
 rem partem ab aliis
 digitis extendēdo ab-
 ducit.

MVSCVLORVM ANATOMES




MVSCVLVS
 oriens ex cubito eiꝑ;
 adherens sub cōmuni
 ligamento stringente
 radium ꝓ cubitū cō-
 tentus, vnicū tendē-
 nem ad indicem pro-
 ducens, non duos ad
 indicem ꝓ medium,
 vt vult Galenus, du-
 cit indicem in latus.

LIBER PRIMVS



MVSCVLVS,
 Oriens ex cubito su-
 pra eius medium, radi-
 um attingit, sub pro-
 prioꝝ ligamento in fi-
 ne radii astrictus, vni-
 cum tendinem produ-
 cit, per totum magnū
 digitum protensum, et
 in latus ipsum ducit
 secundum Galenum.


MVSCVLORVM ANATOMES



MVSCVLVS
ex membrana diuidē
te interiores musculos
ab exterioribus, cubi-
toq; exortus, radium
ascendit, sub proprio
q; ligamēto, in fine ra-
dii (vbi insculptus est
radius) continetur, du-
os tendines producit,
quorū vnus inseritur
extremitati primi os-
sis magni digiti nō p-
cedens ad vltimam
eius aciem, vt voluit
Galenus, alter vero
inserirur ossi brachia-
lis ante magnum dis-
gitū. Potest hic mus-
culus pro duobus has-
beri, ait Galenus, per
alterū enim tendinem
brachiale ad magnum
digitū extēdit, p- reli-
quū verò abducit ma-

gnum digitum ab aliis ipsum aliquialiter extendendo.


LIBER PRIMVS.



MVSCVLVS,
exoriens à nodo exte-
rior brachii supraras-
dium protensus, pro-
prio ligamēto in fine
radii astrictus, bifido
tendine ossibus post-
brachialis ante indis-
cem, et medium dis-
gitos insertus totum
brachiale euertit.

D i i

MVSCVLORVM ANATOMES




MVSCVLVS
 oriens ex ligamento
 mebraneo articuli cu
 bitum aliquatenus at
 tingēs, radiū qua emi
 net per extremum ner
 uosius insertatur, supi
 nam facit manum.

LIBER PRIMVS.




MVSCVLVS
 Supinam manum red
 dens ex brachio pro
 pter medium exoriens,
 supra radiū proten
 sus illi suo fine ad
 vsq; brachiale inserit



A. Musculi quatuor exiles, orientes ex mēbranis circulantibus tendines non fissos, digitorū latera subeunt, in dextra quidē (ma-
nu existente prona) versus sinistram in si-
nistra autē versus dex-
tram, habent mouere
digitos in latus, q̄ qui-
dē sunt in dextra ver-
sus sinistram, et qui
in sinistra versus dex-
tram.

B. Musculus, oriens
ex osse cui annectitur
tendo musculi brachi-
ale ad minimum di-
gitum flectentis, inse-
ritur minimo digito in
feriore in parte, et
ipsum ab aliis digi-
tis abducit.




C. Musculus, oriens
à primo osse brachias-
lis pp̄ magnū digitū
cui inseritur, habet se-
cundū Galenū abdu-
cere eū ab aliis. At vi-
detur factus ad trahē-
dum potius magnū di-
gitū versus minimū.

D. Musculus suo ca-
pite ossi postbrachias-
lis antē mediū digitū
affixus, obliq̄s fibris in-
serit primo ossi magni
digiti, habet adducere
magnū digitū ad indi-
cē interius inclinādo.

E. musculus, siue mus-
culi q̄ siti sunt, supra
musculū abducētē mi-
nimū digitū ab aliis,
in parte interiore ma-
nus extreme, obliquis
fibris cuti herent, et
suis tēdinibus tendini


volē iunguntur, horum musculorū nō meminit Galenus, qui ad
tēdinis volē dilātationem facti videntur.

MVSCVLORVM ANATOMES




MVSCVLVS
de quo Galenus non
meminit, qui in parte
exteriore manus post
brachiali antè indicē
affixus, obliquis fibris
ossi primo magni di-
giti insertus, eum ad
indicem adducit, exte-
rius inclinando, simul
autem cum secundo
præcedentium rectam
adductionem facit,

LIBER PRIMVS



Octo muscoli exiles
corpus vnū carnosum
efficientes, ex coarticu-
latione brachialis, cū
postbrachiali exorti,
binatim priori de artia-
culationi digitorum,
ex interioribus partis
bus inserti, lateraliū
partium aliquid acci-
pientes, simul rectam
flexionem primi artia-
culi faciunt, seorsum
verò flectunt, in latus
parū quid inclinādo.

MVSCVLORVM ANATOMES



Hac in pictura hi nu-
dantur muscoli vidē
licet.


A. Musculi vlnam
extendentes.

B. Musculi vlnā fle-
tentes.

C. Caput musculi su-
pinā manū reddētis.


D. Musculus ceruicis
quem aliqui *Δελη-
οειδης* appellarūt quo-
niā *Δ* grece littera *fi-*
guram imitatur.

LIBER PRIMVS.




MVSCVLVS
iuxta venā humeralē
citra confectionē com-
spicius, duo habet ca-
pita, vnum per patu-
lā brachii rimam ad
Scapularum ceruicis
eminentiā procedens,
alterum ad processum
α'ρυγοειδης vel *κογι-
νοειδης* dictū, hec capi-
ta in idem venientia
hunc musculū genera-
rūt, qui nervosā exili-
tatē faciēs, validū tē-
dinē procreat, quo ra-
dio inseritur, et mem-
branosū ligaminis ar-
ticuli aliqd accipiēs
totū articulū attollit,
paulatim ad interiora
inclinando, cum mus-
culo autem ei subiec-
to rectam flexionem
operatur.

MVSCVLORVM ANATOMES




MVSCVLVS
ex duobus carnosus
principiis brachio cir-
cundatus, vno in pos-
teriori parte altiore,
altero in anteriori hu-
miliore, quæ capita in
idem coeuntia muscu-
lum hunc generant, q
in nerueam desinens
tenuitatē, in cubiti os
insertam, flectit artia-
culum in exteriora pa-
ulatim inclinando, cū
supposito autē mus-
culo rectam flexionē
facit,

LIBER PRIMVS.




MVSCVLVS
ab humili latere scas-
pularū ex dimidio fe-
rē superioris eius par-
tis ortus, iungitur alte-
ri musculo, capiti bra-
chii subdito, ambo per
tendinē latum cus-
biti gibbero iſerūtur,
qui tendo duplex ap-
paret sequēdo fibras,
exteriorēq; partē ab
hoc musculo accipit,
interiorem autem ab
altero, et si disiunctū
vnum ab reliquo ata-
trahat, totā vt Gale-
nus inquit, manū extē-
des, hoc discrimine
intercedente, quod hic
in exteriora, alter in
interiora aliquantulum
deflectendo extendit.

MVSCVLORVM ANATOMES.




MVSCVLVS
 oriens sub capite bra-
 chii, qui iungitur mus-
 culo præcedenti, et alte-
 ri musculo ei subdito,
 adeo ut ipsius particu-
 la ab anatomicis puta-
 tur, possunt tamen
 pro fibrarum rectitu-
 dine seperari, habet
 (ut ait Galenus) exten-
 dere manum totam in-
 tro obliquè deflectēdo

LIBER PRIMVS.



MVSCVLVS
 qui pars præcedentis
 ab Anatomicis puta-
 tur, perpetuò carnosus,
 posterioribus par-
 tibus gibberi inserit,
 rectam articuli exten-
 sionem facit.

LIBRI PRIMI
 FINIS.



Biblioteka Jagiellońska



stdr0028501

